

Je neskorší začiatok pohlavného života spojený z nižším sexuálnym rizikovým správaním?

Autor: Ondrej Kalina, Mgr

**Spoluautor: Andrea Madarasova Geckova PhD,
Assoc. Prof. Olga Orosova PhD, Ferdinand Salonna, MSc
Pavol Jarcuska PhD, Jitse P. van Dijk PhD,
Prof. Sijmen A. Reijneveld**

Východiská

- obdobie adolescencie je charakteristické prvým kontaktom s alkoholom, drogami ale aj prvými sexuálnymi skúsenosťami
- vo svete je práve obdobie adolescencie najrizikovejšie pre nakazenie sexuálne prenosným ochorením
- Napr. až 8mil. prípadov ročne v USA

...východiská

Čo je príčinou takeého správania?

- kumulácia rizikového správania**
- samotné sexuálne rizikové správanie**
- osobnostné faktory**
- sociálne prostredie**

Ciele

Preskúmať možný vplyv neskoršieho začiatku pohlavného života na sexuálne rizikové správanie

Vzorka

828 vysokoškolských študentov

- lekárska fakulta
- prírodovedecká
- technická univerzita

Z toho 352 mužov a 476 žien

Ich priemerný vek 20.5 roka (SD=1.4)

Metódy

Skúmali sme 3 typy sexuálneho rizikového správania (SRS)

- 1. Nepravidelné používanie kondómov – skôr áno, niekedy, nikdy**
- 2. Vyšší počet sexuálnych partnerov – viac ako 3**
- 3. Pohlavný styk pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok (sex za rizikových okolností)**

... metódy

Sexuálna zdržanlivosť

- **v akom veku ste mali prvý pohlavný styk?**
- **ako dlho ste poznali partnera pred prvým pohlavným stykom?**
 - **menej ako mesiac**
 - **mesiac až rok**
 - **viac ako rok**

pri štatistických analýzach bola použitá logistická regresia, SPSS 12

Sexuálne správanie – základne údaje

	Muži (n=355)		Ženy (n=477)	
	N	%	N	%
Pohlavný styk				
Áno	84	61.3	271	63.3
Nie	16	38.7	157	36.7
Sex za rizikových okolností				
Áno	81	44.3	87	23.8
Nie	102	55.7	178	67.2
Vyšší počet sexuálnych partnerov				
Áno	45	26.5	54	21.5
Nie	125	73.5	197	78.5
Nepriavidelné používanie kondómu				
Áno	131	72.4	209	80.7
Nie	50	27.6	50	19.3
Priemerný vek pri prvom poh.styku		17.6		17.4

Výsledky:

T 1.

Pohlavný styk pod vplyvom alk. a iných omamných látok

Vek pri prvom poh. styku	Sig.	OR	CI 95%
18 a viac		1.00	
17 a menej	0.000	3.02	2.01- 4.52
Dĺžka vzťahu pred 1.sexom			
Viac ako rok		1.00	
Mesiac až rok	0.000	3.41	2.03 - 5.70
Menej ako mesiac	0.000	25.22	5.80 - 19.12

...výsledky

T 2.

Nepravidelné používanie kondómov

Vek pri prvom poh. styku	Sig.	OR	CI 95%
18 a viac		1.00	
17 a menej	0.000	2.29	1.40 - 3.74
Dĺžka vzťahu pred .sexom			
Viac ako rok		1.00	
Mesiac až rok	0.44	0.41	0.44 - 1.39
Menej ako mesiac	0.56	0.29	0.56 - 6.71

... výsledky

T 3.

Wyšší počet sexuálních partnerov

Vek pri prvom poh. styku	Sig.	OR	CI 95%
18 a viac		1.00	
17 a menej	0.000	4.44	2.73 - 7.24
Dĺžka vzťahu pred 1.sexom			
Viac ako rok		1.00	
Mesiac až rok	0.000	2.96	1.67 - 5.23
Menej ako mesiac	0.000	4.84	2.04 - 11.45

Diskusia a záver

- **Naše výsledky naznačujú pozitívny efekt neskoršieho začiatku pohlavného na všetky tri typy SRS**
- **Podobne dĺžka vzťahu pred prvým pohlavným stykom sa ukazuje ako pozitívny faktorom**
- **“so sexom máte čas“ —————> len fráza?**
“dobre spoznaj partnera“ —————> len fráza?

Kontakt

Ondrej Kalina

Univerzita P.J. Šafárika

Košický inštitút pre spoločnosť a zdravie

Moyzesová 16, Košice

ondrej.kalina@upjs.sk

Pod'akovanie

Táto práca bola podporená projektom VEGA pod číslom 1/1408/04 a agentúrou pre vedu a výskum pod číslom APVT-20-028802